

Les effets indésirables



Ils sont rares et habituellement bénins. Des réactions locales au point d'injection ont été observées entre le 4^{ème} et 7^{ème} jour après la vaccination. Également, des maux de têtes, douleurs musculaires, associés ou non à une faible fièvre, qui rétrocèdent facilement après la prise de paracétamol. Plus exceptionnellement, éruption cutanée, urticaire ou difficultés respiratoires.

En cas de survenue d'effets indésirables dans le mois qui suit la vaccination

contacter le centre de vaccinations internationales au



77 183 89 89

ou consulter votre médecin



LA FIEVRE JAUNE



36 avenue Pasteur
BP 220
Dakar

☎ 77 183 89 89


**CENTRE DE VACCINATIONS
INTERNATIONALES**

☎ **77 183 89 89**

La fièvre jaune



La fièvre jaune est une maladie virale grave qui se transmet **par la piqûre d'un moustique infecté**.



Elle sévit de façon **endémique** (la fièvre jaune est toujours présente) **dans plusieurs pays africains** et sud-américains.

Elle se manifeste sous forme de jau-nisses et de **mâladies hémorragiques** conduisant dans 20 à 50% des cas au décès.



La vaccination



Il n'existe **aucun traitement**, une fois la maladie déclarée, mais un **vaccin sûr et efficace** permet de se prémunir contre cette maladie.

Ce vaccin à **dose unique**, administré par voie sous cutanée est **recommandé pour les personnes âgées de plus de six mois, vivant en zone d'endémicité**. Il est aussi indiqué pour les voyageurs dans ces zones.



Un **certificat international de vaccination** contre la fièvre jaune doit vous être délivré sur un carnet modèle international. Sa durée de validité est de 10 ans à partir du 10^{ème} jour après la 1^{ère} vaccination, ou immédiatement après un rappel.

Les contre-indications

- Déficits immunitaires acquis ou congénitaux
- Patients infectés par le VIH et symptomatiques. Les patients infectés asymptomatiques peuvent être vaccinés
- Femmes enceintes ou allaitantes, sauf en situation épidémique
- Enfants de moins de 6 mois du fait d'un risque d'encéphalite grave avant cet âge
- Antécédents neurologiques et allergie vraie aux protéines de l'œuf
- Thérapeutiques immunosuppressives (corticothérapie). Il est possible de vacciner si il y a un délai d'un mois entre l'arrêt du traitement et la vaccination.

Le vaccin contre la fièvre jaune peut être administré en même temps que d'autres vaccins.